

농작물 병해충 예찰 및 방제정보

제 16 호

본 정보내용은 농업기술원 '누리집', 제주DA플랫폼에서도 볼 수 있습니다.

농작물 병해충 예찰 및 방제정보 제16호를 다음과 같이 발표합니다. 병해충 적기 방제로 피해가 최소화 되도록 하고, 관계기관에서도 널리 홍보될 수 있도록 협조 바랍니다.

날씨 전망

〈기상청〉

1개월 전망

- 기온: 평년보다 높을 전망

- 강수량: 평년과 비슷하거나 많을 전망

구 분	10월 3주 (9.28.~10.4.)	10월 4주 (10.5.~10.11.)
 평균기온	평년(18.2~19.2℃) 보다 높음	평년(17.4~18.6℃) 보다 높음
 강수량	평년(0.6~7.5mm)과 비슷함	평년(0.2~21.8mm)과 비슷하거나 많음
 특이사항	이동성 저기압, 고기압 영향	

중점 방제대상 병해충

과수

- 노지 감귤 응애류, 총채벌레, 노린재류
- 시설 감귤 응애류, 총채벌레

채소

- 양배추·브로콜리·무 검은점무늬병, 검은썩음병, 벼룩잎벌레, 나방류
- 당근 검은잎마름병, 무름병, 나방류
- 감자 역병, 무름병, 진딧물
- 토마토 곰팡이병, 흰가루병, 토마토뽕나방

농가 행동가이드



- 병든 식물체 즉시 제거
- 병해충 발생 초기 방제
- 시설 내 환기·습도 관리 철저
- 농약 안전 사용 기준 준수

※ 병해충은 시설 내에서 확산 속도가 빠르므로, 정기적인 예찰과 초기 대응을 통해 피해를 최소화해 주시기 바랍니다.

신속한 영농정보

제주특별자치도농업기술원 기술지원조정과 760-7551 제주농업기술센터 760-7751
서귀포농업기술센터 760-7821 동부농업기술센터 760-7621 서부농업기술센터 760-7921

노지 감귤 응애류, 총채벌레, 노린재류

- 10월은 감귤 착색과 수확이 진행되는 시기로, 고온·건조한 날씨가 이어질 경우 **응애류**와 **총채벌레** 발생이 증가하므로 수시로 예찰하여 발생 초기에 방제해 주시기 바랍니다. 또한 가을철 기온 변화로 해충 발생 양상이 달라질 수 있으므로 과원 내 잎과 과실을 꼼꼼히 살펴 피해 여부를 확인하고, **노린재류**에 의한 과실 피해가 우려되는 과원은 예찰을 강화하여 적기에 방제해 주시기 바랍니다.
- 방제약제
 - **응애류** 비수(액수), 엔비도스피드(액수), 응애스타(액수), 주웁(액수), 후론사이드(수) 등
 - **총채벌레** 닥트롤(유탕), 더윈(입수), 완타치(입수), 액스라지(액수), 엔젤팜(액수) 등
 - **노린재** 브리가드(액수), 빅카드(액수), 독소리(입수) 등

시설 감귤 응애류, 총채벌레

- 시설 감귤은 외부 기온이 낮아지더라도 시설 내 온도가 높고, 건조한 환경이 지속될 경우 **응애류**와 **총채벌레**를 수시로 예찰하여 발생 초기에 방제해 주시기 바랍니다. 특히 착색·수확기에는 해충에 의한 과실 피해를 예방할 수 있도록 관리하고 수확을 앞둔 시기인 만큼 농약 안전사용기준을 반드시 준수하여 방제해 주시기 바랍니다.
- 방제약제
 - **응애류** 노블레스(액수), 마이트킹(액수), 마스터프로(수), 비수(액수) 등
 - **총채벌레** 다데스(액수), 왕중왕(입수), 액스라지(액수), 퍼펙트(액수) 등



볼록총채벌레 피해



차면지응애피해



씩덩나무노린재



행동가이드

농약안전사용기준을
잘 지켜 안전한 농산물을 생산합시다!

양배추·브로콜리·무 검은점무늬병, 검은썩음병, 벼룩잎벌레, 나방류

- 기온 변화와 토양 수분이 많아질 수 있는 시기로 **검은점무늬병·검은썩음병** 발생이 우려되므로 배수 및 포장 관리를 철저히 해 주시기 바랍니다. 또한 **벼룩잎벌레**와 **나방류** 피해가 나타날 수 있으므로 수시로 예찰하여 발생 초기에 방제하시고, 병든 잎과 피해 잔재물은 신속히 제거해 주시기 바랍니다.



검은점무늬병(양배추)

- 방제약제
 - **검은점무늬병(공통)** 푸르겐(수), 젠토왕(수) (브로콜리) 로브랄(수), 다코닐(수) 등
 - **검은썩음병(양배추)** 방범대(수), 젠토가스신(입수), 태풍(수), 한우물(수용) 등 (브로콜리) 메가폰(입수), 브레이브(입수), 성보크린(수), 크러쉬(입수) 등
 - **벼룩잎벌레(양배추·무)** 엘산(유), 엑셀트(액수), 토리치(분액) 등
 - **담배거세미나방(양배추·무)** 알지오(유탕), 젠토런(액수), 캡틴(유) 등
 - **배추좀나방(양배추·브로콜리·무)** 동작그만(유), 미네토스타(액수), 알지오(유탕), 킹팜골드(유) 등

당근 검은잎마름병, 무름병, 나방류

- 기상 여건에 따라 **검은잎마름병**과 **무름병**이 증가할 수 있으므로 포장 내 물빠짐을 좋게 관리해 주시고, **나방류**도 생육 중 지속적으로 피해를 줄 수 있으므로, 수시로 예찰하여 발생 초기에 방제하고 생육 관리에 유의해 주시기 바랍니다.



잎마름병

- 방제약제
 - **검은잎마름병** 가스란(수), 다코닐에이스(액수), 보가드(입수), 크러쉬(입수) 등
 - **무름병** 일품(수), 영일스마트(입수), 젠토가스신(입수), 한우물(수) 등
 - **나방류** 런너(액수), 아타브론(유), 코난(유), 프레바톤(수) 등

감자 역병, 무름병, 진딧물

- 일교차가 커지며 잦은 강우가 지속되면 토양 습도가 올라가 **역병, 무름병**이 발생하기 쉬우므로 밭 물빠짐(배수) 관리를 철저히 하여주시고, **진딧물** 발생 초기에 전용 약제로 방제하여 건강한 생육 상태를 유지해 주시기 바랍니다.



수염진딧물

- 방제약제
 - **역병** 다코닐에이스(액수), 명작(액수), 텔루스(액수), 포룸디(수) 등
 - **무름병** 가스란(수), 메가폰(입수), 일품(수), 태풍(수), 한누내(액수) 등
 - **진딧물** 아타라(입수), 장원(유), 코니도(수) 등

토마토 곰팡이병, 흰가루병, 토마토불나방

- 시설내부 습도가 올라가면 **잎곰팡이병·잿빛곰팡이병** 발생 위험이 높아지며, 건조 조건에서는 **흰가루병**이 확산될 수 있으므로 적절한 환기와 온습도 관리가 필요합니다. **토마토불나방**은 발생 초기 방제가 매우 중요하며, 피해 잎 발견 즉시 제거해야 합니다. 이후 발생 포장 전체에 등록된 농약을 약액이 작물에 고루 묻도록 꼼꼼히 살포해 주시고, 2회 이상 약제를 살포할 경우에는 작용 기작이 다른 약제를 교차 사용하여 내성이 생기지 않도록 예방이 중요합니다.

● 방제약제

- **곰팡이병** 사파이어(액수), 트리후민(수), 카디스(액수) 등
- **흰가루병** 카디스(액수), 캐스팅(액수), 트리후민(수) 등
- **토마토불나방** 캡틴(유), 네이팜(유), 엑셀트(입수), 벨스모(유) 등



흰가루병



토마토불나방 유충

수확기 “감귤” 주요 농약 안전사용 기준

구분	상표명	수확전 사용시기	사용 횟수	구분	상표명	수확전 사용시기	사용 횟수
살충제	엔 젤 팜(액수)	7일	3회	살균제	머 니 업(수)	7일	3회
	델 리 게 이 트(입수)	7일	2회		베 푸 란(액)	14일	1회
	엔비도스피드(입수)	14일	3회		해 비 치(수)	7일	3회
	섹 큐 어(액수)	7일	3회		스 포 르 곤(수)	7일	2회
	마 이 트 킹(액수)	14일	2회	살비제	더 원(입수)	21일	3회
	총 채 나 방 방(액수)	14일	2회		다이마이트(분액)	14일	2회
	만 장 일 치(수)	14일	3회		비 수(액수)	21일	3회
	엑 스 라 지(액수)	14일	2회		응 애 스 타(액수)	14일	3회