



농작물 주간 영농동향 및 관리요령(27호)

2026. 07. 16. / 제주특별자치도농업기술원



기상상황

□ 기상현황 ('26. 7. 1. ~ 7. 15.)

(자료출처: 제주지방기상청)

구분	제주			서귀포			성산			고산		
	본년	전년	평년	본년	전년	평년	본년	전년	평년	본년	전년	평년
평균기온(°C)	27.6	27.4	25.0	25.9	27.9	24.5	25.6	26.8	23.9	25.0	26.7	23.6
강수량(mm)	69.0	71.3	130.7	160.0	4.7	191.9	137.7	10.9	175.5	97.1	19.2	121.9
일조시간(hr)	101.3	120.0	72.0	34.2	119.7	50.5	63.9	101.6	58.2	59.5	130.8	61.2

- [평균기온] 도평균 26.0°C로 전년보다 1.1°C 낮고, 평년보다 1.8°C 높았음
- [강 수 량] 도평균 116.1mm로 전년보다 86.4mm 많고, 평년보다 38.9mm 적었음
- [일조시간] 도평균 64.7시간으로 전년보다 53.3시간 적고, 평년보다 4.3시간 많았음

□ 주간 기상전망

일자	20일(월)		21일(화)		22일(수)		23일(목)		24일(금)	25일(토)	26일(일)
	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후			
강수확률	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	30%
제주	25 / 31		26 / 32		26 / 31		25 / 31		26 / 32	25 / 31	25 / 32
서귀포	23 / 27		24 / 27		24 / 27		24 / 28		24 / 28	23 / 28	23 / 29
성산	26 / 30		26 / 30		26 / 30		25 / 30		25 / 30	24 / 29	25 / 30
고산	26 / 29		26 / 29		26 / 29		26 / 29		26 / 29	26 / 29	26 / 29

- [하늘상태] 대체로 흐리겠음
- [기온예보]
 - 아침 기온은 23~26°C, 낮 기온은 27~32°C로 평년(최저기온 24~25°C, 최고기온 29~31°C)과 비슷하겠음

주간 영농동향 및 주요작물 관리요령

1 과 수

【 노지감귤 】 2차 생리낙과 마무리 단계

- 여름전정: 여름순이 발생하였거나 발생이 우려되는 가지는 발아 가능한 봄순 3~5마디를 남기고 절단
 - 봄순이 강한 경우: 봄순 15~20cm에서 절단전정 및 봄순이 충분한 경우 기부에서 제거
 - 봄순이 보통인 경우: 봄순 끝에서 먼저 나오는 여름순 전정
 - 봄순이 약한 경우: 전년도 가지에서 절단 전정
- ※ 수세가 너무 강하거나 가을철까지 고온이 예상되는 경우는 전정시기를 일주일 정도 늦춤
- 병해충 방제: 고온기에는 약해 발생 우려가 있으므로 이른 아침 기온이 낮은 시간대에 농약을 살포하고, 농약 혼용은 가급적 피함
 - (검은점무늬병) 누적강수량 200~250mm이상 일경우 전용약제 및 기계유유제 혼용 재살포
 - (각지벌레) 기온 상승에 따라 유충 발생이 증가할 것으로 예상되므로 예찰 및 적기 방제 필요
 - (총채벌레) 기온상승과 비례하여 총채벌레 밀도 증가함에 따라 예찰 후 전용약제 살포
 - (굴녹응애) 크기가 작아 육안으로 확인이 어렵기 때문에 전년도 발생하였던 과원 중심으로 피해 잎·열매를 예찰 후 전용약제 살포

【 만 감 류 】 과실 비대기

- 온도관리: 천·측창을 모두 개방하여 최대한 외부온도와 가깝게 유지
- 물 관 리: 장마 종료 후 기온 상승으로 증산량이 증가할 것으로 예상되므로 토양수분 상태를 고려하여 충분히 관수하여 적습 유지
 - (생리낙과~비대기) 3~5일 간격으로 20t/10a 관수
 - 최근 기온이 높아 한낮에 관수할 경우 잎·열매에 피해가 발생할 수 있으므로 주의
- 열매숙기: 열매가 많은 나무위주 2차 적과 작업 실시
 - 8월까지 잎 100~120매 당 1과, 12~13과/m² 기준으로 적과작업 실시
- 열매 매달기: 가지 부러짐방지, 열매 마찰방지, 품질향상 등을 위해 가급적 일찍 실시
 - 나무의 윗부분은 약간 아래로, 가운데 부분은 약간 위로, 아랫부분은 30°이상 상향
- 병해충방제: 응애류, 총채벌레, 진딧물, 잎말이나방 등 예찰 후 방제 실시

【 키 위 】

- 재배관리: 결과지 상단부 순지르기 및 적심, 눈따기 실시
 - (눈 따 기) 주간 및 주지에서 발생한 불필요한 싹 제거
 - (순지르기) 결과지의 최종 결실부로부터 7~8눈 남기고 순지르기 실시
- 물 관 리: 4~5일 간격으로 20~30t/10a 관수
- 병해충방제: 점무늬병, 연부병, 잣빛곰팡이병, 총채벌레 등 예찰 및 방제 실시

2 발작물

【 미니단호박 】 수확률 70% 내외

- 수확시기: 개화 후 40~45일 경 과병부에 코르크화의 균열이 발생 시 수확
- 수확 후 관리: 과병부 건조를 촉진시켜 저장 중 부패 방지
 - 수확 후 과병부의 절단면에서 일비액이 나오지 않을 때까지 건조 및 큐어링 실시
 - 큐어링: 실내 그늘진 곳에서 온도 25℃ 습도 70~85% 내외로 10~14일 유지
 - 미니단호박을 쌓을 때는 과병부 절단면이 위로 향하게 하며, 너무 많이 쌓지 않도록 주의
- 큐어링 후 보관: 상온저장 또는 12~14℃ 저온보관
- 병해충 방제: 비 예보시 덩굴마름병, 흰가루병, 검은별무늬병 등 병해충 방제 작업 실시

【 당 근 】

- 파종시기: 해안지역(7월중순~8월중순), 중산간지역(7월하순~8월중순)
- 토양시비: 파종 1주 전, 토양검정 결과에 따른 밑비료 시비 후 경운작업 실시
(표준시비량: 요소 13kg, 용성인비 48kg, 황산가리 14kg/10a)

【 더 덕 】

- 장마철 과습과 통기 불량시 시들음병, 줄기썩음병, 녹병 등 곰팡이성 병이 많아질 수 있으므로 배수로 정비와 전용 약제 살포

【 콩 】 파종 마무리 단계

- 제초관리: 파종 후 3일 이내 제초제를 사용하며 강우 예보가 없을 시 유제 사용

【 참 깨 】

- 5월 상순 파종한 포장 개화·결실기이며, 초장 70cm 내외
- 어린 참깨는 과습에 취약하므로 배수로를 정비하고 역병, 시들음병, 잎마름병 방제를 철저히 해야함