



농작물 주간 영농동향 및 관리요령(28호)

2026. 07. 30. / 제주특별자치도농업기술원



기상상황

□ 기상현황 ('26. 7. 1. ~ 7. 29.)

(자료출처: 제주지방기상청)

구분	제주			서귀포			성산			고산		
	본년	전년	평년	본년	전년	평년	본년	전년	평년	본년	전년	평년
평균기온(°C)	28.7	28.3	26.1	27.4	28.6	25.7	26.9	27.4	25.1	26.3	27.4	24.8
강수량(mm)	69.0	141.9	210.2	160.5	19.1	278.3	137.7	44.7	271.8	97.3	68.9	167.3
일조시간(hr)	237.6	255.0	189.2	138.6	243.5	144.8	171.0	235.5	159.6	169.8	262.5	173.0

- [평균기온] 도평균 27.3°C로 전년보다 0.6°C 낮고, 평년보다 1.9°C 높았음
- [강 수 량] 도평균 116.1mm로 전년보다 42.6mm 많고, 평년보다 115.3mm 적었음
- [일조시간] 도평균 179.3시간으로 전년보다 69.9시간 적고, 평년보다 12.6시간 많았음

□ 주간 기상전망

일자	3일(월)		4일(화)		5일(수)		6일(목)		7일(금)	8일(토)	9일(일)
	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후			
강수확률	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
제주	26 / 34		26 / 33		27 / 34		26 / 33		26 / 33	27 / 34	27 / 34
서귀포	26 / 33		26 / 32		27 / 33		26 / 32		26 / 32	27 / 33	26 / 33
성산	25 / 33		26 / 33		27 / 32		26 / 31		26 / 30	26 / 31	27 / 31
고산	27 / 32		27 / 33		28 / 32		28 / 32		27 / 32	28 / 32	28 / 32

- [하늘상태] 대체로 맑겠음
- [기온예보]
 - 아침 기온은 26~27°C, 낮 기온은 32~34°C로 평년(최저기온 26°C내외, 최고기온 32°C내외)과 비슷하거나 조금 높겠음

주간 영농동향 및 주요작물 관리요령

1 과 수

【 노지감굴 】 2차 생리낙과 종료

- 여름전정: 여름순이 발생하였거나 발생이 우려되는 가지는 발아 가능한 봄순 3~5마디를 남기고 절단
 - 봄순이 강한 경우: 봄순 15~20cm에서 절단전정 및 봄순이 충분한 경우 기부에서 제거
 - 봄순이 보통인 경우: 봄순 끝에서 먼저 나오는 여름순 전정
 - 봄순이 약한 경우: 전년도 가지에서 절단 전정
- ※ 수세가 너무 강하거나 가을철까지 고온이 예상되는 경우는 전정시기를 일주일 정도 늦춤
- 물관리: 토심이 얇은 과원이나 과다 착과된 나무를 중심으로 관수 실시
- 병해충 방제: 고온기에는 약해 발생 우려가 있으므로 이른 아침 기온이 낮은 시간대에 농약을 살포하고, 농약 혼용은 가급적 피함
 - (검은점무늬병) 누적강수량 200~250mm이상 일경우 전용약제 재살포
 - (깍지벌레) 기온 상승에 따라 유충 발생이 증가할 것으로 예상되므로 예찰 및 적기 방제 필요
 - (굴굴나방) 여름순 발생초기에 방제하며 특히 어린나무·휴식년 나무는 방제 철저
 - (총채벌레) 기온상승과 비례하여 총채벌레 밀도 증가함에 따라 예찰 후 전용약제 살포
 - (굴녹응애) 크기가 작아 육안으로 확인이 어렵기 때문에 전년도 발생하였던 과원 중심으로 피해 잎·열매를 예찰 후 전용약제 살포

【 만 감 류 】 과실 비대기

- 온도관리: 천·측창을 모두 개방하여 최대한 외부온도와 가깝게 유지
 - 차광망 35%로 하우스 외부 2/3내외 피복 혹은 오전11시~오후3시 경 커튼으로 하우스 1/2정도 차광
 - 미스트시설 및 유동헨 설치 시 짧게 자주 미스트 분사 및 헨 가동
 - * 기화되지 못한 큰 입자의 물방울이 과실에 맺힐 경우 피해 우려
- 물 관 리: 지속되는 가뭄으로 토양수분이 부족한 포장은 충분한 관수를 실시하여 수분 스트레스를 최소화하고 적습 유지
 - (생리낙과~비대기) 3~5일 간격으로 10~20t/10a 관수
 - 최근 기온이 높아 한낮에 관수할 경우 잎·열매에 피해가 발생할 수 있으므로 주의
- 열매숙기: 열매가 많은 나무위주 2차 적과 작업 실시
 - 8월까지 잎 100~120매 당 1과, 12~13과/m² 기준으로 적과작업 실시
- 열매 매달기: 가지 부러짐방지, 열매 마찰방지, 품질향상 등을 위해 가급적 일찍 실시
 - 나무의 윗부분은 약간 아래로, 가운데 부분은 약간 위로, 아랫부분은 30°이상 상향
- 병해충방제: 응애류, 총채벌레, 진딧물, 잎말이나방 등 예찰 후 방제 실시

【 키 위 】

- 재배관리: 결과지 상단부 순지르기 및 적심, 눈따기 실시
 - (눈 따 기) 주간 및 주지에서 발생한 불필요한 싹 제거
 - (순지르기) 결과지의 최종 결실부로부터 7~8눈 남기고 순지르기 실시
- 물 관 리: 4~5일 간격으로 20~30t/10a 관수
- 병해충방제: 점무늬병, 연부병, 잣빛곰팡이병, 총채벌레 등 예찰 및 방제 실시

2 발작물

【 당 근 】 파종률 10%내외(계속된 가뭄으로 파종 지연 중)

- 파종시기: 해안지역(7월중순~8월중순), 중산간지역(7월하순~8월중순)
- 토양시비: 파종 1주 전, 토양검정 결과에 따른 밑비료 시비 후 경운작업 실시
(표준시비량: 요소 13kg, 용성인비 48kg, 황산가리 14kg/10a)

【 마 늘 】

- 포장준비: 파종 2~4주 전 퇴비 및 석회 시비하고 깊이갈이 또는 경운작업 실시
 - 퇴비는 2,000kg/10a 내외를 시비하며 석회는 토양pH 측정 후 사용량 결정
- 병해충방제: 전년도 흑색썩음균핵병 등 병발생이 심했던 포장은 토양소독 실시
- 종구준비: 210~260kg/10a의 종구를 준비하며, 인편분리는 파종 직전에 하는 것이 병해충 및 건조 방지에 유리

【 콩 】 파종 마무리

- 6월~7월상순 파종 포장은 신장기, 7월중순~하순 파종 포장은 발아기~유묘기 진행 중
- 제초관리: 파종 후 3일 이내 제초제를 사용하며 강우 예보가 없을 시 유제 사용
- 병해충방제: 고온·가뭄이 지속됨에 따라 포장 예찰을 강화하고 노린재류, 담배거세미나방 등 주요 병해충을 등록약제로 적기 방제 실시

【 참 깨 】

- 5월 상순 파종한 포장 고투리 형성기이며, 5월 중순~6월상순 파종 포장 개화·결실기
- 어린 참깨는 과습에 취약하므로 배수로를 정비하고 역병, 시들음병, 잎마름병 방제를 철저히 해야함

원예작물 재배를 계획할 때에는 반드시 관수시설이 확보된 포장을 선택해야 가뭄·폭염들의 자연재해를 대비할 수 있습니다.

폭염 단계별 대응요령

(공통사항)

- 기상청 폭염특보 및 예보를 수시로 확인 (기상청 홈페이지, 앱 활용)
- 시원하고 깨끗한 물과 쉴수 있는 그늘(휴식공간)준비
- 작업자가 요청하는 경우 쿨토시 등 보냉장구 제공
- 나홀로 작업은 최대한 피하고, 2인 1조로 움직이기
- 고령 농업인 및 온열질환 민감군은 무리한 야외 활동을 자제
- 실내작업장의 경우 차광망, 송풍기, 미스트 등 냉방·환기장치 작동 여부를 사전 점검
- 온열질환 증상 발생 시 신속히 119 신고 및 응급조치

(주의) 일 최고 체감온도 33℃ 이상 2일 이상 지속

- 매 2시간 이내 20분 이상의 휴식을 부여
- 온열질환 민감군, 작업강도가 높은 작업자 휴식시간 추가 배정
- 무더위 시간대(낮12~17시) 야외 및 고온 실내환경 농작업 단축 또는 작업시간대 조정

(경고) 일 최고 체감온도 35℃ 이상 2일 이상 지속

- 매 2시간 이내 20분 이상의 휴식을 부여
- 온열질환 민감군, 작업강도가 높은 작업자 휴식시간 추가 배정
- 무더위 시간대(낮12~17시) 불가피한 경우를 제외하고는 야외 및 고온 실내환경 농작업 중지
- 가급적 새벽~오전 중에 작업 마무리하도록 조정
- 불가피한 실외 농작업 시 휴식시간 충분히 부여