



농작물 주간 영농동향 및 관리요령(37호)

2026. 10. 23. / 제주특별자치도농업기술원



기상상황

□ 기상현황 ('26. 10. 1. ~ 10. 21.)

(자료출처: 제주지방기상청)

구분	제주			서귀포			성산			고산		
	본년	전년	평년	본년	전년	평년	본년	전년	평년	본년	전년	평년
평균기온(℃)	21.3	23.8	19.4	22.1	25.1	20.4	20.9	23.5	19.1	20.7	23.3	19.3
강수량(mm)	76.0	93.4	74.8	145.4	68.0	73.4	62.7	147.4	81.1	61.5	51.6	41.8
일조시간(hr)	102.1	90.9	120.2	110.9	125.1	140.8	109.0	94.7	132.2	102.6	116.7	142.1

- [평균기온] 도평균 21.3℃로 전년보다 2.6℃낮고, 평년보다 1.7℃ 높았음
- [강 수 량] 도평균 89.5mm로 전년보다 7.2mm적고, 평년보다 21.7mm 많았음
- [일조시간] 도평균 106.2시간으로 전년보다 0.7시간, 평년보다 27.7시간 적었음

□ 주간 기상전망

일자	27일(화)		28일(수)		29일(목)		30일(금)		31일(토)	01일(일)	02일(월)
	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후			
강수확률	20%	20%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%
제주	17 / 20		11 / 18		12 / 19		13 / 21		15 / 19	13 / 17	12 / 16
서귀포	16 / 17		12 / 16		11 / 17		15 / 21		14 / 19	13 / 18	13 / 17
성산	16 / 17		9 / 15		10 / 18		15 / 21		13 / 16	9 / 15	11 / 15
고산	18 / 21		12 / 16		13 / 20		17 / 22		15 / 18	12 / 16	12 / 16

- [하늘상태] 맑은 날이 많겠으나, 27일(화), 30일(금)은 구름많겠음
- [기온예보]
 - 아침 기온은 16~17℃, 낮 기온은 19~20℃로 평년(최저기온 12~14℃, 최고기온 19~22℃)보다 최저기온은 높고 낮 최고기온은 비슷하거나 조금 낮겠음

주간 영농동향 및 주요작물 관리요령

1 과 수

【 노지감귤 】 극조생 감귤 수확 및 출하 중(조생종 착색 진행 중)

- 수확작업: 극조생 감귤 출하 시 품질기준(샘플의 80% 이상 당도 8.5°Bx 이상) 준수
 - 부패방지를 위해 비가 내린 뒤 3일 이상 지난 후 수확하며, 수확 후 3일정도 예조
 - 수확 7~15일 전까지 부패방지제 살포(농약별 안전사용기준 준수)
- 토양피복: 정기적인 품질조사 결과 및 기상상황에 따라 관수량 조절 필요
 - 품질 조사 후(10월 20일 당도 11.3°Bx, 산함량 1.28% → 10월 30일 당도 11.9°Bx, 산함량 1.17%) 기준보다 당도가 낮으면 다음 조사까지 건조, 당도가 높으면 2일에 4t/10a 관수
 - 비로 토양에 물이 유입된 경우 피복자재를 걷어 빠른 토양 건조 실시
- 병해충 방제: 수확기 약제 살포는 매우 신중을 기해야 하며 농약 안전사용기준 준수
 - (흡즙해충) 노린재, 초록애매미충 등 밀도가 높을 경우 전용약제 살포

*노린재의 경우 방풍수 주변 방제 병행

【 만 감 류 】 과실비대 및 착색기(황금향·레드향·천혜향 착색 시작, 전년 대비 7~10일 빠름)

- 온도관리: 일교차가 커지면서 새벽 과실에 이슬맺힘 현상을 방지하기 위해 환기 철저
 - 부피과, 화아분화 억제, 가을순 발생을 방지하기 위해 주간온도는 20℃ 이상이 되지 않도록 관리하고 야간온도는 자연온도로 관리
- 물관리: 당도가 증가하는 시기로 계획적인 품질관리가 중요하며, 여름철(7~8월) 관수 부족 과원에서 레드향 등 후기 열과가 지속 발생하고 있으므로 급격한 토양수분 변화 방지
 - 10~15일 간격으로 5~10t/10a를 기준으로 품질검사 후 관수량 결정

※ 무가온 재배기준 10월 품종별 품질 목표

구분	한라봉	천혜향	레드향	황금향
당도(°Bx)	10.0(11.5)	8.2(9.2)	9.5(11.5)	10.0(11.5)
산함량(%)	2.0(1.5)	3.6(2.5)	2.5(1.6)	1.3(1.1)

* () 내 수치는 11월 품질 목표 기준임

- 병해충 방제: 총채벌레(5~7일 간격 철저한 예찰 후 조기 방제)

응애류(주기적 예찰로 발생 초기 방제) 실시

* 수세가 약하거나 일부 품종(천혜향, 레드향 등)은 약해에 민감하므로 약제 살포 시 주의

【 키 위 】 과실성숙기 및 골드키위(감황) 수확 진행 중(전년 대비 약 1주 빠름)

- 수확작업: 품종별 당도, 건물률 등 품질조사 결과에 따라 수확시기 결정
 - 시설 골드키위('감황')는 출하기준(당도 7.5°Bx 이상, 건물률 17.0% 이상, 경도 5.5kg/8mmø 이상, 색도 103 이하) 충족 과원부터 수확
 - 그린키위('헤이워드')는 과중이 10월까지 증가하고 건물률은 11월 상순까지 증가함
 - 상처가 없고 단단한 큰 과실을 먼저 수확하며, 수확 후 10°C에서 2~3일 예조 실시
 - 상처과가 혼입되면 에틸렌 발생으로 과실이 연화될 수 있으므로 수확·운반 시 유의
- 병해충 방제: 뽕나무각지벌레, 과실연부병, 점무늬병 등 예찰·방제 실시

2 발작물

【 양채류 】 정식 완료, 양배추 결구 및 브로콜리 화뢰 분화 진행 중

- 생육상황
 - (양배추) 8월 중순 정식포장은 구 비대 중(구 직경 13~15cm 내외), 8월 하순~9월 상순 정식포장은 결구 시작 (* 결구 및 출뢰 최적온도: 15~16°C)
 - (브로콜리) 8월 중순 이전 정식포장(조생종)은 본엽 10~15매 전개 및 화뢰 분화 시작으로 10월 하순 화뢰 출현·비대 전망
 - (기상피해 관리) 9월 하순 이후 정식묘에서 바람에 의한 뿌리 돌림현상이 일부 발생하고 있으므로 복토(복주기) 등 사후관리 필요
- 양분관리

구분	1차	2차	3차
	정식 30일 후	1차 시비 15일 후	2차 시비 15일 후
양배추	요소 14kg	요소 14kg + 염화칼륨 10kg	요소 14kg + 염화칼륨 10kg
브로콜리	요소 9kg + 염화칼륨 5~7kg	요소 9kg + 염화칼륨 5~7kg	
콜라비	요소 5kg + 염화칼륨 4kg		
비트	요소 7.5kg + 염화칼륨 7.5kg	요소 7.5kg + 염화칼륨 7.5kg	

- 병해충 방제: 전년 대비 시들음병 발생이 증가하는 추세이며, 서부지역 일부 포장에서 브로콜리·콜라비 뿌리혹병이 발생하고 있어 철저한 예찰 및 방제 필요
 - 양배추: 시들음병, 검은썩음병, 무름병, 나방류(배추좀나방 등) 등
 - 브로콜리: 검은썩음병, 검은무늬병 등
 - 비트: 갈색점무늬병 등 적기 방제 지도

【 당 근 】 수확작업 완료 및 뿌리 비대기(파종기 가뭄·조풍 피해로 지역별 생육 편차)

- 생육상황: 8월 상순 파종 기준 초장 45cm, 엽수 8~9매로 생육 중이나, 최근 고온다습한 날씨로 일부 포장에서 무름병 및 줄기 웃자람 증상 발생
- 복주기: 수확 1개월 전 뿌리 상단부가 노출되어 녹색화되지 않도록 복주기(복토) 작업 실시
- 양분관리: (2차 웃거름) 파종 후 50일 경 요소 13kg/10a, 염화加里 3kg/10a(황산加里 3.6kg/10a)시비
(3차 웃거름) 파종 후 70일 경 요소 9kg/10a 시비
- 병해충관리: 최근 고온다습 및 비 날씨로 무름병, 세균잎마름병, 검은잎마름병, 나방류 등 발생 우려가 높으므로 배수로 정비 및 적용약제 방제 철저

【 월 동 무 】 파종 완료 및 본엽 전개(생육기) 진행 중

- 생육상황: 9월 고온 및 가뭄 영향으로 9월 중순 이후 파종 포장을 중심으로 발아 불량에 따른 재파종(5~10% 내외)이 이루어져 파종시기별 생육지연 및 편차 발생
- 복주기: 생육 향상, 잡초 관리 및 강우 대비 배수로 정비를 위해 복주기 작업 실시
- 양분관리: (1차 웃거름) 파종 후 20일 경 요소 11kg/10a, 염화加里 9kg/10a 시비
(2차 웃거름) 1차 시비 후 15일 경 요소 11kg/10a, 염화加里 8kg/10a 시비
- 병해충관리: 초기 생육기 거세미나방 등 나방류, 벼룩잎벌레 등 해충 방제 및 무름병, 노균병, 흰무늬병 등 병해 방제 작업 실시

【 마 늘 】 파종 완료 및 지상부 출현·본엽 전개 중

- 생육상황
 - (구마늘) 출현율 70% 내외, 초장 10~20cm로 정상 생육 중
* 전년 동기 출현율 15~50% 내외 대비 출현 양호
 - (잎마늘) 엽수 4~6매, 초장 30~40cm 내외로 생육은 균일하나, 일부 포장에서 잎끝 마름 증상 및 뿌리응애 피해 발생
- 수분 및 양분관리
 - (수분관리) 구마늘은 강우상황을 보며 수분관리 실시
(비가 없을 경우 10일 간격으로 30t/10a 정도를 2~3회 관수)
 - (양분관리) 잎마늘 웃거름 살포(요소 12kg/10a, 염화加里 10kg/10a) 및 제초작업 실시
- 병해충 방제: 일부 잎마늘 포장에서 발생 중인 뿌리응애 방제 및 잎마름병, 흑색썩음균핵병, 고자리파리 등 예찰·방제 지도

【 양 파 】 조생종 정식 진행 중, 중만생종 포장준비 및 10월 하순 정식 시작 전망

○ 정식 및 포장준비

- (조생양파) 정식묘(엽수 3~4매, 초장 25~35cm) 생육 양호하며 인력 및 기계정식 추진 중
- (만생양파) 정식 전 밑비료 시비, 경운작업 후 멀칭비닐 피복작업 진행 중이며 10월 하순(10. 25.경)부터 정식 예정(김녕 등 일부지역은 앞작물 콩 성숙 지연으로 11월 중순으로 정식 전망)

* 표준시비량(kg/10a): 퇴비 2,000, 석회 100, 요소 17, 용성인비 40, 염화加里 10

* 정식기준: 정식본수 33,000주/10a 내외(이랑 120cm, 줄간격 20~24cm, 포기간격 10cm)

- 육묘 후기 관리: 묘판이 건조하지 않도록 수분관리를 지속하고, 육묘 후반기 나방류(순나방 등), 고자리파리, 잘록병 등 방제 철저

【 콩 】 등숙 후기~성숙기 진입(10월 하순부터 수확 시작 전망)

- 생육상황: 전체 포장 황화기 도달(95~100%)하였으나 생육기 초기 가뭄 및 고온 영향으로 낙엽 진행이 다소 완만함

- 수확관리: 잎이 누렇게 되어 떨어지고 꼬투리의 80~90% 이상이 황갈색으로 변색될 때 적기 수확 실시(해찬·풍산나물 10월 하순, 아람 11월 상·중순 수확 전망)

- 기계수확 시 성숙 후 15일 경(개화 후 60일 경) 줄기와 꼬투리가 마를 때(종실 수분함량 18~20% 내외) 수확 실시

- 후기 재해 및 병해충 관리: 계속된 비·흐린 날씨에 대비하여 배수로 사전 정비로 습해 차단

- 꼬투리와 종실의 곰팡이병, 자주무늬병(자반병) 등 후기 병해 및 종실 부패·수발아 예방을 위해 적기 수확 및 수확 후 건조·정선 지도 강화

※ 노린재 방제: (1차) 개화 후 10~15일, (2차) 1차 살포 후 10~15일 후