

영농정보

동부농업기술센터



2월의 영농정보

□ 노지감귤

○ 수확 후 관리

맑은 날 오전 요소 0.2%액(40g/물 20L)

7~10일 간격 2~3회 엽면시비

○ 유기물 및 석회고토 시용

10a 기준 완숙퇴비 2,000kg, 석회고토 100kg 시용

- 가급적 토양검정 후 시비처방서를 참고하여 시용

○ 과원 환경정비

방풍수 정비, 간벌 등

(* 간벌: 병 발생이 줄고 광합성을 증대하여 당도 상승)

□ 만감류

○ 한라봉, 레드향, 천혜향 상품 검사 기준

당도 11.5브릭스(Brix) 이상, 산함량 1.1% 이하

- 정기적 품질(당도, 산함량) 분석 후 관수량 조절

(10일~15일 간격 5톤/10a, 가급적 오전 일찍 관수)

○ 온도관리

낮 10~15℃ 이하, 밤 2℃ 이상 보온,

맑은 날 밤~새벽에 냉기류 침체 주의

○ 수확 후 관리


수확 후 1회 충분한 물주기,

맑은 날 오전 요소 0.3%액(60g/물 20L) 1회 엽면시비

○ 유기물 및 석회고토 시용

10a 기준 완숙퇴비 2,000kg, 석회고토 100kg 시용

- 가급적 토양검정 후 시비처방서를 참고하여 시용



□ 월동무

- **적기 수확**을 통한 비상품 무 유통 금지,
한파에 따른 언피해 회복 여부 파악 후 선별 출하
- **병해충 방제**
수확이 지연될 경우, 노균병, 무름병 등 예찰 방제 필요
(* 노균병은 기온 15℃ 내외일 때 발생)

□ 당근

- **적기 수확**을 통한 비상품 당근 유통 금지
- 당근 상품 기준: 1개당 중량 130g ~ 350g, 길이 13 ~ 22cm

□ 감자

- **싹틔우기**
온도 15~20℃, 습도 80~90%, 기간 20~30일,
싹의 길이 5mm 정도
- 씨감자 절단 시 파종 3~7일 전 큐어링 완료한 후 심음
- **밑거름주기**
10a 기준 퇴비 1,500kg, 요소 22kg, 용성인비 50kg,
염화加里 20kg

□ 종구용 쪽파

- **병해충 방제**: 노균병, 흑색썩음균핵병, 고자리파리 등
[미등록된 농약 사용 금지 유의, *Linuron* 성분, *Omethoate* 성분]



□ 마늘

○ 월동을 위한 잎수 확보

10일 간격 꾸준한 물주기 필요,
강우 지속 시 잎끝마름증상 발생주의
(* 잎끝마름증상: 토양 과습으로 칼리 흡수가 저하되어 발생,
배수로 정비 및 칼리 시비로 대응)

○ 웃거름주기

(2월 상중순) 10a 기준 요소 12kg, 염화加里 10kg

○ 병해충 방제

흑색썩음균핵병, 세균성점무늬병, 고자리파리 등
작물보호제 예방 살포

□ 만생양파

○ 웃거름주기

(2월 중하순) 10a 기준 요소 17kg, 염화加里 8kg
→ 웃거름 시기 지연 시 저장성 약화

○ 병해충 방제

흑색썩음균핵병, 노균병, 잿빛곰팡이병, 고자리파리 등
작물보호제 예방 살포

※ 자세한 내용은 동부농업기술센터 특화작목육성팀(760-7621~4)
신기술보급팀(760-7641~3)으로 문의하여주시면 감사하겠습니다.

