

영농정보

동부농업기술센터



4월의 영농정보

□ 노지감귤

○ 꽃비료주기

- 4월 하순~, 요소0.3%액(60g/20L) 엽면시비로 새순과 꽃봉오리 충실 도모

○ 병해충 방제

- 더듬이병·굴응애 동시방제
4월 하~5월 상, 기계유유제 100배 + 푸르겐 또는 확시란 2,000배
→ 단, 전년도 더듬이병 발생 포장이나 염려되는 과원은 새순이 1~1.5cm
자란 4월 상순경 방제

□ 만감류

○ 온도관리

- 주야간 온도차를 10℃ 정도로 유지
(한라봉은 꼭지깃 발생 유도를 위해 12~13℃ 유지)

○ 물관리

- 개화기 이후, 물주는 양을 절반으로 줄이고 환기 철저
(과습에 의한 잣빛곰팡이병 예방)

○ 병해충 방제

- 응애: 천혜향은 백화기, 이외 품종은 개화가 20~30% 진행될 때 기계유유제 (95%) 100배액 살포
- 총채벌레: 잎끝과 꽃잎이 갈변하고 새순 발아기에 전용약제 방제
(다트룰, 렘페이지, 슈퍼펀치 등)

□ 참다래

○ 적리

- 결과지당 3~5개의 꽃봉오리를 남겨둠, 곁꽃봉오리·기형·가장 앞쪽 또는 가장 뒤쪽 꽃봉오리 제거

○ 병해충 방제

- 궤양병·꽃썩음병 약제 방제(가스란, 아그리마이신 등)

□ 봄감자

○ 강풍 대응


- 바람에 의한 비닐파손 시 복구 작업 실시

○ 가뭄 대응

- 감자 비대가 시작되는 시기로 건조한 날씨가 지속되면 관주하여 괴경 비대 조장

○ 병해충 방제

- 역병(다코닐, 미리카트, 클립톤 등), 무름병(메가폰, 방범대, 일품 등), 진딧물(데시스, 모스피란, 장원 등)



□ 마늘

○ 마늘종 제거

마늘종 출현 시 가급적 빨리 제거해야 구 비대 유리함

○ 병해충 방제

잎집씩음병(메가톤, 방범대, 일품 등),

잎마름병(다이센엠45, 살림꾼, 카브리오 등)

□ 만생양파

○ 구 비대가 시작되는 시기로 주기적 물관리필요

○ 병해충 방제

노균병(더존, 리도밀골드, 이슬탄), 무름병(옥토퍼스, 크러쉬 등),

잿빛곰팡이병(깨꼬탄, 레빅사, 후론사이드 등),

총채벌레(돌격대, 렘페이지, 모스피란 등)

□ 종구용 쪽파

○ 온도상승에 따른 과번무가 되지 않도록 주의

○ 병해충 방제

노균병(더존, 리도밀골드, 이슬탄), 무름병(블루칩, 비온 등),

잿빛곰팡이병(깨꼬탄, 레빅사, 후론사이드 등),

총채벌레(동작그만, 쏘렌토, 코니도 등)

□ 단호박

○ 정식

정식 전 10일 이내 비닐피복으로 지온을 확보(뿌리내림 양호)

○ 터널작업

터널을 씌울 때 충분한 흙을 덮어 강풍 피해 예방

○ 물관리

정식과 터널 작업이 끝나면 충분한 관수로 고온 피해 예방

※ 자세한 내용은 동부농업기술센터 특화작목육성팀(760-7621~4),
신기술보급팀(760-7641~3)으로 문의하여 주시면 감사하겠습니다.

